

## 朝比奈泰彦：地衣類雑記 (§ 69 追記)

Yasuhiko ASAHINA: Lichenologische Notizen (§ 69-b)

## § 69-b 追記

地衣類雑記 § 69 (本誌第 21 卷, Nos. 7~12, p. 124~126) で筆者は *Parmelia pubescens* Wain. を *Alectoria* に再編入することを発表した。所が其後 Mackenzie Lamb (Nytt Magasin for Naturvidenskapene, B. 80, p. 264 [1939]) の示唆で Degelius が既に同様の處置を採つて居ることが判明した。即ち Degelius は Nytt Magasin for Naturvidenskapene, B. 78, p. 285 (1938) で従来 *Parmelia* 属に入れてあつた *P. minuscula* や *P. pubescens* が縦走する皮層菌絲を持つことは *Parmelia* に入れ難い點を指摘し *Alectoria* 属に新節 *Subparmelia* Degel. を創設して之を編入した。従て *Alectoria* 属は次の 3 節から成立する：

Genus *Alectoria* Ach.:

Sect. 1. *Bryopogon* (Link) Th. Fr.: 葉體は直立又は懸垂；褐色，類黑色，灰色，橙綠色等；擬盃點は通常缺如し；胞子は無色で一子嚢に 8 箇，

Sect. 2. *Subparmelia* Degel.: 葉體は少くも幼時扁壓され；褐色又は類黑色；擬盃點なく；胞子は無色で一子嚢に 8 箇。

Sect. 3. *Eualectoria* Th. Fr.: 葉體は直立又は懸垂し；類黑色又は淡黄色；擬盃點を具へ；胞子は通常帶暗色，一子嚢に 2~4 箇。

Degelius (Nytt Magasin for Naturvidenskapene, B. 78, p. 285, 1938) had already proposed that *Parmelia minuscula* as well as *Parmelia pubescens* are to be included in the genus *Alectoria*, on grounds of microscopic anatomy. I have overlooked his paper and made similar treatment in § 69 (J. J. B. 21: 124, 1947).

## ○澁無シガヤ・(久内清孝)

澁皮のない榎が岐阜縣，養老郡，多良村 字宮と云ふところにあり，之に *Torreya nucifera* Sieb. et Zucc. forma monst. *ramulifera* F. Maekawa. と前川文夫氏が命名されたと故吉田裕氏が本誌 18: 479 及濃飛植物目錄に記して居るが，昔し甲斐國二の宮社にもそのシブナシガヤが名物として存したことが菊岡米山の諸國里人談(寛保3年)に「澁は皮うらに付て仁に澁なく至つて白し此種他に栽るに生ぜずとなり」と書いてある，いつの世にも似たようなことが話題になるものらしい，話の泉の資料として報じてをく。